

Guía De Anticoagulantes Antes del Procedimiento

Droga	Cuando Detenerlo	
	Epidural, Estimuladores, Simpático & Trigeminales	Inyección de Faceta
Aspirina		
Aspirina y Aspirina Combinadas	6 Dias	No
Excedrin (OTC Aspirina Combinadas)	6 Dias	No
Percodan (Oxicodona/Aspirina)	6 Dias	No
NSAIDs		
Celecoxib (Marca: Celebrex)	4 Dias	No
Diclofenac (Marca: Cambia, Cataflam, Voltaren, Zorvolex)	1 Dia	No
Etodolac (Marca: Lodine, Lodine XL)	2 Dias	No
Ibuprofeno (Marca: Advil, Motrin)	1 Dia	No
Combunox (Marca: Oxycodone/Ibuprofen)	1 Dia	No
Duexis (Marca: Ibuprofeno Combinadas)	1 Dia	No
Indomethacin (Marca: Indocin, Tivorbex)	2 Dias	No
Ketorolac (Marca: Toradol)	1 Dia	No
Meloxicam (Marca: Mobic, Vivlodex)	4 Dias	No
Nabumetone (Marca: Relafen)	6 Dias	No
Naproxen (Marca: Aleve, Anaprox, Naprosyn)	4 Dias	No
Vimovo (Naproxen Combination)	4 Dias	No
Oxaprozin (Marca: Daypro, Daypro Alta)	10 Dias	No
Piroxicam (Marca: Feldene)	10 Dias	No
Inhibidores de la fosfodiesterasa		
Cilostazol (Marca: Pletal)	2 Dias	No
Dipyridamole (Marca: Aggrenox)	2 Dias	No
Anticoagulantes/ Antitrombóticos		
Apixaban (Marca: Eliquis)	5 Dias	No
Clopidogrel (Marca: Plavix)	7 Dias	No
Edoxaban (Brand: Savaysa)	3 Dias	No
Dabigatran (Marca: Pradaxa)	5 Dias	No
Heparin (Subcutáneo)	10 Horas	No
LMWH Profiláctico (Generico: Dalteparin, Marca: Fragmin) (Generico: Enoxaparin, Marca: Lovenox) (Generico: Tinzaparin, Marca: Innohep)	12 Horas	No
LMWH Therapeutic (Generico: Dalteparin, Marca: Fragmin) (Generico: Enoxaparin, Marca: Lovenox) (Generico: Tinzaparin, Marca: Innohep)	24 Horas	No
Prasugrel (Marca: Effient)	10 Dias	No
Rivaroxaban (Marca: Xarelto)	3 Dias	No
Ticagrelor (Marca: Brilinta)	5 Dias	No
Warfarin (Coumadin)	5 Dias	No
Acenocoumarol (Coumadin Derivative)	3 Dias	No
Fibrinolíticos		
Fondaparinux (Arixtra)	4 Dias	No

- Antes de suspender los anticoagulantes, los pacientes necesitan obtener permiso de su proveedor de atención primaria (PCP)